

แคหัวหมู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Markhamia stipulata* (Wall.) Seem. var. *stipulata*

วงศ์ : BIGNONIACEAE

ลำต้น :

จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 5-15 เมตร

ใบ :

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ยาวประมาณ 20-55 เซนติเมตร มีใบย่อยประมาณ 4-8 คู่ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานหรือเป็นรูปแกมรูปรี หรือแกมรูปใบหอก ยาวประมาณ 8-25 เซนติเมตร โคนใบแหลมถึงเกือบกลม ส่วนปลายใบแหลม แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขนขึ้นอยู่ประปราย ก้านใบมีขนาดสั้นหรือยาวไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร

ดอก :

ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกยาวประมาณ 15-35 เซนติเมตร แต่ละช่อมีดอกประมาณ 4-10 ดอก ก้านดอกยาวประมาณ 2-6 เซนติเมตร ส่วนกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 3.3-5.5 เซนติเมตร และมีขนปุย ส่วนกลีบดอกเป็นสีเหลืองตุ่นๆ บางครั้งอาจปนสีแดงอยู่ด้านใน

ผล :

ลักษณะของฝักเป็นรูปแถบ ยาวประมาณ 30-70 เซนติเมตร ฝักมีขนปุย ๆ

เมล็ด :

ภายในฝักมีเมล็ดกว้างประมาณ 1-1.3 เซนติเมตรและยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร

สรรพคุณ :

- เป็นยารักษาโรคอัมพฤกษ์

ประโยชน์ :

- ดอก (กลีบดอก) และผลอ่อนหรือฝักอ่อนสามารถรับประทานได้
- นำมาใช้ก่อสร้างบ้านเรือน

ชื่ออื่น :

แคอว ขุ่ม แคขน แคหางค่าง แคซอน แคปุมหมู แคยอดคำ แคว แคหมากลิ้ม

เป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดและดินร่วนปนทราย ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด สามารถพบได้ตามป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าคันทวย ไปจนถึงระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร ส่วนในต่างประเทศ 1,700 เมตร มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศจีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน และในประเทศไทย สำหรับในไทยจะพบได้ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และทางภาคใต้ตอนบน



อ้างอิง :

- <https://medthai.com/แคหัวหมู>
- <https://www.camelliaoilcenter.com/แคหัวหมู>