



แดงน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Pometia pinnata* J.R. & G. Forst.

วงศ์ : SAPINDACEAE

ลำต้น :

ไม้ต้น สูงได้ถึง 50 เมตร

ใบ :

ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ใบย่อยมี 4–13 คู่ เรียงเกือบตรงข้าม คู่ล่างคล้ายหูใบ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปไข่กลับ เบี้ยวเล็กน้อย ขอบใบจักซี่ฟัน แผ่นใบด้านล่างมีต่อม เส้นแขนงใบเรียงจรดขอบใบ ช่อดอกคล้ายช่อกระจุกแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 70 ซม.

ดอก :

ดอกขนาดเล็กสีครีม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันบางส่วน กลีบดอกสั้นหรือยาวกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย คล้ายรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า เกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 2–6 มม. รังไข่มีขน ก้านเกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย

ผล :

ผลผนังชั้นในแข็ง มี 2 พู ส่วนมากเจริญพูเดียว รูปรี ยาว 1.5–5 ซม. ปลายหนา ก้านสั้น เมล็ดรูปไข่เบี้ยว ยาวประมาณ 2.5 ซม. มีเยื่อหุ้มบาง ๆ มีขี้เมล็ดกลม ขนาดประมาณ 5 มม.

สรรพคุณ :

- น้ำคั้นจากเปลือกใช้รักษาแผลสด แผลไฟไหม้ แก้ไข้

ประโยชน์ :

- ผลรับประทานได้
- เป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะในนิวกินี และซามัว

ชื่ออื่น :

เคาะ แแดงน้ำ ทริย ไม้สาย สั่งมา สาย แสนตาล้อม



พบที่ศรีลังกา อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ ไต้หวัน ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ถึงหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา โดยเฉพาะริมลำธาร ความสูงถึงประมาณ 1700 เมตร



อ้างอิง :

- <https://botany.dnp.go.th/detaildict.html?wordsLinkno=2054&words=%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&typeword=word>
- <https://botany.dnp.go.th/detaildict.html?wordsLinkno=2054&words=%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&typeword=word>
- https://www.picturethisai.com/th/wiki/Pometia_pinnata.html