

ก่อดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Lithocarpus truncatus* (King ex Hook. f.)
Rehder

วงศ์ : FAGACEAE

ลำต้น :

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม.

ใบ :

ใบรูปขอบขนาน รูปใบหอก หรือรูปใบหอกกลับ ยาว 12–29 ซม.
ก้านใบยาว 1–2 ซม.

ดอก :

ช่อดอกแบบช่อหางกระรอก แยกแขนง ช่อดอกยาว 5–15 ซม.

ผล :

ผลรูปกรวย กว้าง 2.5–3.5 ซม. สูง 2–3 ซม. ฝักหุ้มผลเกือบ
ตลอดผลยกเว้นช่วงปลาย เชื่อมติดกันที่โคนหรือแยกกัน
เกล็ดเชื่อมติดกัน มีขนสั้นนุ่ม

ชื่ออื่น :

ก่อเกล็ดดำ ก่อข้าว ก่อตุก



พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ลาว และเวียดนาม ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ยกเว้นภาคตะวันออก
เฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าสนเขาและป่าดิบเขา ความสูง 900–1300 เมตร

อ้างอิง :

- <https://www.dnp.go.th/botany/mindexdictdetail.aspx?runno=508>
- https://www.dnp.go.th/botany/PDF/publications/Princess_Sirindhorn_60anniversary/6%20Ency.pdf
- <https://koratdaily.com/blog.php?id=14108>

