



ข่อยหนาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Streblus ilicifolius* Corner

วงศ์ : MORACEAE

ลำต้น :

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. หนามยาว 1-4.5 ซม. กิ่งมีขน

ใบ :

หูใบยาว 3-8 มม. ใบรูปรี รูปไข่กลับ ยาว 4-25 ซม. ปลายมีติ่งคล้ายหนาม ขอบจักฟันเลื่อยเป็นหนามห่างๆ

ดอก :

ช่อดอกเพศผู้แบบช่อเชิงลด 1-2 ช่อ ยาว 1-5 ซม. ก้านช่อและก้านดอกสั้นมาก กลีบรวมยาวประมาณ 1 มม. เกสรเพศผู้ยาว 2-2.5 มม. ช่อดอกเพศเมียแบบช่อกระจุก ออกเดี่ยว ๆ ก้านช่อยาวประมาณ 1.5 ซม. มี 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 2-8 มม. กลีบรวมยาว 1-2 มม. กลีบคู่ในขยายในผลยาวได้ถึง 1 ซม. มีขนครุย ยอดเกสรยาว 2-3.5 มม.

ผล :

ผลเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. กลีบรวมหุ้มประมาณกึ่งหนึ่ง

สรรพคุณ :

- เปลือก แก้ท้องร่วงรำมะนาด บำรุงธาตุ เจริญอาหาร ขับลมยาอายุวัฒนะ
- ใช้ลำต้นและรากตากแห้ง ต้มหรือบดโดยใช้ร่วมกับตัวยาอื่น แก้อาการปวดเมื่อย บำรุงโลหิต และอาการอักเสบภายใน

ชื่ออื่น :

กระชิด กะฉิม กาซิม ขี้แรด ขี้แรดควน ขี้แรดเมีย ไชนกฤษ มะโอมิ ไม สยอง หนามแฉง อีแรด

พบที่อินเดีย บังกลาเทศ จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในไทยพบกระจายทั่วไปทุกภาค โดยเฉพาะตามเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร





อ้างอิง :

- <https://www.dnp.go.th/botany/mindexdictdetail.aspx?runno=957>
- https://www.navanurak.in.th/rayongbotanic/pic/specimen_upload/RYG20190410/YYYYYYYYYY.pdf
- <https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/webcontest2003/100team/dlss019/data/dean6.html>