



ตะแบกเกี๋ยบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Lagerstroemia cochinchinensis* Pierre
วงศ์ : LYTHRACEAE

ลำต้น :

ความสูง 5-30 ม. โคนต้นเป็นพุ่มพอง เปลือกเรียบเป็นมัน สีเหลืองหรือสีน้ำตาลอมแดง มีรอยแผลเป็นหลุมตื้นตลอดลำต้น กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่ม สีน้ำตาลอมแดงหนาแน่น

ใบ :

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรีหรือรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนสอบเรียวหรือค่อนข้างกลม ขอบเรียบ แผ่นใบบางคล้ายกระดาษถึงหนาค่อนข้างหนา

ดอก :

ช่อดอกแบบช่อกระจุกเชิงประกอบ ออกตามปลายกิ่ง โปรงแตกแขนงเล็กน้อย โค้งขึ้นเล็กน้อย มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลอมแดงหนาแน่น ดอกในช่อมีจำนวนน้อย ดอกตูมรูปลูกข่าง มีสันนูนเล็กน้อยโดยรอบและมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลหนาแน่น ดอกแรกบานสีม่วงอมแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีจางลง



ผล :

ผลแบบผลแห้งแตกกลางพู ทรงรูปไข่ ปลายมีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ผลแก่แตก 5 หรือ 6 เสี้ยว เมล็ดค่อนข้างแบน มีปีก

ประโยชน์ :

- ปลูกเป็นไม้ประดับ
- เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง



ชื่ออื่น :

โคะกางแอ้ ตะแบกเกี๋ยบแดง ตะแบกใบเล็ก เปื่อยกะเอ็ง

มีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยเกือบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณที่สูงตั้งแต่ใกล้ระดับทะเลปานกลางถึงประมาณ 500 ม. ออกดอกเดือนมกราคมถึงสิงหาคม เป็นผลเดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคม ในต่างประเทศพบที่เมียนมา จีน และภูมิภาคอินโดจีน





อ้างอิง :

- <https://botany.dnp.go.th/detaildict.html?wordsLinkno=2303&words=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A&typeword=word>
- <http://rspg.mfu.ac.th/plant-genetic-conservation/botany/detail/112>
- https://lst.nectec.or.th/encyclopedia/wikipedia/plant_taxonomy/view/index.php?namelink=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A&cid=73