



ตาเสือ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Aphanamixis polystachya* (Wall.) R.Parker
วงศ์ : MELIACEAE

ลำต้น :

จัดเป็นไม้ยืนต้น มีความสูงได้ถึง 25 เมตร เปลือกต้นหนา แตกเป็นสะเก็ดหลุดล่อนออก ตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีเหลือง



ใบ :

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายใบคี่ ออกเรียงสลับ มีใบย่อยประมาณ 3-7 คู่ ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบกลมเบี้ยว ส่วนขอบใบเรียบเป็นคลื่น ๆ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-7 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-18 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบเกลี้ยงเป็นสีเขียวเข้ม

ดอก :

ออกดอกเป็นช่อแยกแขนงยาว โดยจะออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกเป็นแบบแยกเพศ มีทั้งช่อดอกเพศผู้ ช่อดอกเพศเมีย และช่อดอกที่มีทั้งสองเพศ ดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองอ่อน ลักษณะเป็นรูปทรงกลม กลีบเลี้ยงดอกเชื่อมติดกันปลายแยกออกเป็น 3 แฉก สีเขียวและมีขน ส่วนกลีบดอกมี 3 กลีบ สีเหลือง เกสรเพศผู้เชื่อมติดกัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ



ผล :

ผลมีลักษณะกลม ขนาดประมาณ 3.5-5 เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตกออกเป็น 2-3 ซีก

เมล็ด :

ภายในผลมีเมล็ดสีน้ำตาลดำและมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง

สรรพคุณ :

- เป็นยาแก้ธาตุพิการ ยาปิดธาตุ ยาแก้ท้องเสีย ยาสมานแผล

ประโยชน์ :

- นำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ดี เพราะเนื้อไม้มีความแข็ง เหนียว มีความแข็งแรงทนทานดี
- ผลใช้เป็นอาหารของนกเงือก

ชื่ออื่น :

เลาหาง ขมื่นดง เช่ เย็นดง ตาปู่ มะยมหางก่าน ตุ่มดง มะหังก่าน มะฮังก่าน มะอ้า โกล ตาเสือ แดงน้ำ เชื้อย โทกล้ำ พุแกที เส่กู่เก๊ะ ยมหังก่าน

ทุกส่วนของต้นตาเสือเป็นพิษ กินมากอาจทำให้ตายได้ และเห็ดที่เกิดจากขอนไม้ตาเสือเมื่อกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการเมาอาเจียนถึงตายได้เช่นกัน



อ้างอิง :

- <https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/smhcontrol/herb/281>
- <https://medthai.com/ตาเสือ>
- <https://www.disthai.com/17378200/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD>

